

《漢方とボラザ注入の方法》

《간포와 보라자 관장 방법》

- ① **ボラザ G 軟膏を 5 個、漢方1袋を準備し、ボラザ G は中身を破棄して下さい。**
보라자G 연고 5개, 간포 1봉투를 준비한 후, 보라자G 연고의 내용물은 전부 빼버리십시오.
- ② **空容器にお湯を約 10ml入れます。**
빈 그릇에 따뜻한 물 약 10ml 를 넣습니다.
- ③ **②に漢方を入れ、3分~5分放置します。**
②번 그릇에 간포를 넣고 3분~5분 방치해둡니다.
- ④ **スプーン等で混ぜ合わせます。**
스가락 같은 것으로 잘 섞어줍니다.
- ⑤ **①で中身を捨てたボラザ G の容器に④を吸い戻します。**
(1 個の容器に約 2ml入ります。)
① 번에서 내용물을 버린 보라자 G 용기에 ④번 약을 다시 넣습니다.
(보라자 용기 1 개에 약 2ml 들어갑니다.)
- ⑥ **ノズル部分を肛門内に挿入し、ゆっくり注入した後、押したままで引き抜いてください。**
노즐 부분을 항문 안에 삽입하고 천천히 주입한 후 용기를 누른 채 잡아 뺍니다.
- ⑦ **1 回につき 1 個を使います。**
1 번에 1 개 사용하십시오.



注入後下着が汚れないように工夫してください。
주입 후 속옷에 묻지 않도록 주의하십시오.

破棄するボラザ G の中身を挿入時に潤滑油として利用も可能です。
빼버린 보라자 G 연고의 내용물은 삽입 시에 윤활유로 묻혀서 사용하실 수 있습니다.