


# 女性の健康サポーター 養成ワークショップ

山梨まんまくらぶ

2012年5月28日(月)


# 山梨県の年齢調整がん罹患率 2009年(男女計)

山梨県がん年齢調整罹患率2009男女  
(年齢調整罹患率の基準人口を1985年日本モデル人口とした場合)




# 山梨の性別年齢階級別罹患率

## 年齢階級別罹患率男59歳まで



## 年齢階級別罹患率女59歳まで



山梨県地域がん登録2009より若尾編集 (0歳～60歳未満を抽出)


# 女性には女性のための対策を！



# 乳がん・子宮頸がん検診受診率

乳がん・子宮頸がん検診受診率  
2010年(過去2年)国民生活基礎調査

■ 乳がん  
■ 子宮頸がん



# 子宮頸がん撲滅も目標

- 自分でできる対策

- 子宮頸がん検診

検診場所：検診車や自治体紹介の病院

費用はまちまち 600円～

検診方法もまちまち

（甲府市はHPVの DNA検査導入）

- HPV予防ワクチン接種

全市町村助成対象

国も定期接種に向け準備中

国は平成25年度から定期接種の対象となるよう調整中

# HPV予防ワクチンの種類

| ワクチンの種類             | 接種間隔   | 接種回数 |
|---------------------|--|------|
| 2価ワクチン<br>「サーバリックス」 | 初回接種、初回接種から1ヶ月後、初回接種から6ヶ月後<br>※ただし、やむを得ず接種間隔の変更が必要な場合は、2回目の接種は1回目の接種から1～2.5か月の間に、3回目の接種は1回目の接種から5～12か月の間に接種する。   | 3回   |
| 4価ワクチン<br>「ガーダシル」   | 初回接種、初回接種から2ヶ月後、初回接種から6ヶ月後<br>※ただし、2回目及び3回目の接種が初回接種の2か月後及び6か月後にできない場合、2回目接種は初回接種から少なくとも1か月以上、3回目接種は2回目接種から少なくとも3か月以上の間隔を置いて接種する。また、1年以内に3回の接種を終了することが望ましい。 | 3回   |

# 乳がん・子宮頸がんは怖いもの？

- 怖いのは無関心
- がんの死亡者は全体的に減っているけど、乳がん・子宮頸がんの罹患は増え、日本では死亡者も増えている
- 乳がん、子宮頸がんの正しい情報を知って自分のからだと向き合おう
- 乳がん、子宮頸がんは克服できるがん
- 克服のためには関心を持とう！



# がんを知り、がんと向き合い がんを負けない社会の構築

