

現在、生後6週～生後7か月未満の子

2020年4月1日現在(太田市)

定期	任意	ワクチン名	生 / 不活化	備 考
●	●	・ロタワクチン	生	◎<<2回接種のワクチン使用の場合>> ★1回目:生後6週(1か月半)～20週(生後5か月)までに開始。／出来るだけ早く開始を。 ただし、当院では、初回接種上限を生後16週(4か月)としています。 ★2回目:1回目より4週間あけて／生後24週までに(当院では20週を上限として)接種を終了して下さい。
				◎<<3回接種のワクチン使用の場合>> ㊟ 当院では3回接種のワクチンは使用していません。 ★3回目:2回目より4週間あけて／生後32週までに接種終了。
		2020.8.1.生まれより定期接種		
●		・Hibワクチン	不活	◎生後2か月～生後7か月となる日の前日までの場合 ★初回接種:27日以上(4週間)の間隔で3回接種。 ★追加接種:初回接種の3回目から7か月～13か月の間に1回接種(できるだけ早く!!)。
●		・肺炎球菌ワクチン	不活	◎生後2か月～生後7か月となる日の前日までの場合 ★初回接種:27日以上(4週間)の間隔で3回接種。 ★追加接種:1歳過ぎてから接種。但し、初回接種の3回目から60日以上あける必要があります。
●		・BCG	生	◎標準的(推奨)な接種期間は、生後5か月～7か月です。 ※1歳の誕生日前日までは定期接種として接種可能です。
●		・4種混合ワクチン	不活	◎生後3月～生後7歳6か月となる日の前日までに”初回接種3回+追加接種1回”を終了して下さい。 ★初回接種:3～8週(当院では4週間)の間隔で3回。その後追加接種。(㊟出来るだけ早い接種開始を。) ★追加接種:標準的には初回接種の3回目終了後12～18か月あけて実施。ただし、6ヶ月過ぎれば接種可。
●		・B型肝炎	不活	●<定期接種は>生後2か月～1歳未満。／できるだけ早く開始した方が効果があります。 母子感染予防のためにB型肝炎ワクチン等を新生時期に接種した子は定期接種より除外されます。 ★初回接種:4週間の間隔で2回接種。 ★追加接種:1回目接種から139日開けて(=20週後)。(定期接種は1歳未満／1歳過ぎは任意接種)