

現在、生後7か月～生後12か月（1歳）未満の子

2020年4月1日現在(太田市)

定期	任意	ワクチン名	生 / 不活化	備 考
●		・Hibワクチン	不活	◎7か月までに1回以上接種をしている子は「生後6週～7か月未満」参照。 ◎初回接種が生後7～12か月となる日の前日までの間となる場合 ★初回接種:4～8週間の間隔で2回接種。 ★追加接種:初回接種の2回目から7か月～13か月の間に1回接種。
●		・肺炎球菌ワクチン	不活	◎7か月までに1回以上接種をしている子は「生後6週～7か月未満」参照。 ◎初回接種が生後7～12か月となる日の前日までの間となる場合 ★初回接種:4～8週間の間隔で2回接種。 ★追加接種:1歳過ぎてから1回接種。  但し、初回接種の2回目から60日以上あける必要がある。
●		・BCG	生	◎標準的(推奨)な接種期間は、生後5か月～7か月です。ただし、1歳になるまでは接種可能です。 ※外傷等によるケロイドの認められる子は接種不可
●		・4種混合ワクチン	不活	◎生後3月～生後7歳6か月となの前日までに”初回接種3回+追加接種1回”を終了して下さい。 ★初回接種:3～8週の間隔で3回接種。(注 出来るだけ早い接種開始を。) ★追加接種:標準的には、3回目接種後1年～1年半で接種。(ただし、3回目から6ヶ月以上あければ接種可です)
●		・B型肝炎ワクチン	不活	●<定期接種は>生後2か月～1歳未満。／できるだけ早く開始した方が効果があります。 ★初回接種:4週間の間隔で2回接種。 ★追加接種:1回目接種から139日開けて(=20週後)。(定期接種としてはは1歳未満まで／1歳以後は任意接種)