

02-02-09 — 1歳までの乳児には『ハチミツ』を与えないで下さい



ハチミツを与えるのは**1歳**を過ぎてから

重要なお知らせ

赤ちゃんのお母さん・お父さんやお世話をする方へ

1. 1歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べることによって乳児ポツリヌス症にかかることがあります。
2. ハチミツは1歳未満の赤ちゃんにリスク(⇒危険度)が高い食品です。
3. ポツリヌス菌は熱に強いので、通常の加熱や調理では死にません。
1歳未満の赤ちゃんにハチミツやハチミツ入りの飲料水・お菓子などの食品は与えないようにしましょう。(⇒特に、外国製には気を付けましょう。)

1歳未満の乳児には
与えないで下さい

出来れば
2歳過ぎてから



食品事業者の方へ

ハチミツおよびハチミツを含む食品は「1歳未満の乳児には与えないで下さい。」という情報を、表示などにより消費者に分かりやすく提供するようお願いいたします。(⇒表示してない商品も有ります、注意を。)

乳児ポツリヌス症は、国内では、1999年以降16例。米国では毎年100例以上の報告があります。

その他「生卵」使用の料理(=卵かけご飯など)や十分加熱されていない「肉類」もバイ菌がいることも有るため要注意です。また、それらを調理した「まな板や包丁・箸(はし)等」も良く洗わずに離乳食作りに使用すると、赤ちゃんにとっては、『安全と言えない』こともあり、死亡や障害が残る場合も有ります。1歳半過ぎる頃には、赤ちゃんも丈夫になり、抵抗力も強くなります。それまで我慢・注意をお願いします。