


## 《漢方注腸の方法》

### 《간포 관장 방법》




1.漢方半袋とお湯 20mlを適当な容器に入れよくかき混ぜ溶かします。

1.간포 반 봉지와 미지근한 물 20ml 를 적당한 용기에 넣고 잘 섞어 녹입니다.



2.溶かした漢方を注射器に吸います。

2.잘 녹인 간포를 주사기로 빨아들입니다.



3.注射器の先にカテーテルをしっかり接続しカテーテルの先端 まで漢方を満たします。

3.주사기에 카테터를 꼭 연결하고 카테터의 끝부분까지 간포를 전부 채웁니다.

4.汚れても良いように、お風呂かトイレで注腸します。

4.삼입은 화장실이나 목욕탕에서 하실 것을 권합니다.

5.肛門にカテーテルを 10cm程度挿入し漢方を注入します。

5.항문에 카테터를 10cm 정도 집어넣고 간포를 주입합니다.

※ 排便は注入後、出来るだけ 30 分以上待ってから行って下さい。

배변은 주입한 후 될 수 있으면 30 분 이상 참았다가 가십시오.

※ チューブは毎回交換です。注射器は、注腸 5 回につき 1 個です。洗ってご使用ください。

튜브는 일회용입니다. 주사기는 1 개당 5 번 관장할 수 있습니다. 씻어서 사용하십시오