

## 1 章 微分法

## § 2 いろいろな関数の導関数 (p.31~p.43)

問 1

$$(1) \quad y = \log u, \quad u = \sin x$$

$$(2) \quad y = \frac{1}{u}, \quad u = x^2 + 1$$

$$\text{または, } y = \frac{1}{u+1}, \quad u = x^2$$

問 2

$$(1) \quad y' = 5(x^2 - x + 1)^4 \cdot (x^2 - x + 1)' \\ = 5(x^2 - x + 1)^4(2x - 1)$$

$$(2) \quad y' = e^{\cos x} \cdot (\cos x)' \\ = e^{\cos x} \cdot (-\sin x) \\ = -e^{\cos x} \sin x$$

$$(3) \quad y' = \frac{1}{x^2 - 1} \cdot (x^2 - 1)' \\ = \frac{1}{x^2 - 1} \cdot 2x \\ = \frac{2x}{x^2 - 1}$$

$$(4) \quad y = (x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = \frac{1}{2}(x^2 + 1)^{-\frac{1}{2}} \cdot (x^2 + 1)' \\ = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot 2x \\ = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

問 3

$$(1) \quad y' = 2 \cos x \cdot (\cos x)' \\ = 2 \cos x \cdot (-\sin x) \\ = -2 \sin x \cos x$$

$$(2) \quad y' = 2 \tan x \cdot (\tan x)' \\ = 2 \tan x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \\ = \frac{2 \tan x}{\cos^2 x}$$

問 4

$$(1) \quad y' = 3 \cos^2 2x \cdot (\cos 2x)' \\ = 3 \cos^2 2x \cdot (-\sin 2x) \cdot (2x)'$$

$$= -3 \cos^2 2x \sin 2x \cdot 2 \\ = -6 \cos^2 2x \sin 2x$$

$$(2) \quad y' = (e^{4x})' \cos(x^2) + e^{4x} \cdot \{\cos(x^2)\}' \\ = 4e^{4x} \cos(x^2) + e^{4x} \cdot \{-\sin(x^2)\} \cdot (x^2)' \\ = 4e^{4x} \cos(x^2) - e^{4x} \sin(x^2) \cdot 2x \\ = 2e^{4x} \{2 \cos(x^2) - x \sin(x^2)\}$$

$$(3) \quad y' = 5\{\log(x^3 + 1)\}^4 \cdot \{\log(x^3 + 1)\}' \\ = 5\{\log(x^3 + 1)\}^4 \cdot \frac{1}{x^3 + 1} (x^3 + 1)' \\ = \frac{5\{\log(x^3 + 1)\}^4}{x^3 + 1} \cdot 3x^2 \\ = \frac{15x^2 \{\log(x^3 + 1)\}^4}{x^3 + 1}$$

問 5

$$(1) \quad y = \log(x - 1)^2 - \log(x + 1)^2 \\ = 2 \log(x - 1) - 2 \log(x + 1)$$

$$y' = 2 \cdot \frac{1}{x - 1} (x - 1)' - 2 \cdot \frac{1}{x + 1} (x + 1)' \\ = \frac{2}{x - 1} - \frac{2}{x + 1} \\ = \frac{2(x + 1) - 2(x - 1)}{(x - 1)(x + 1)} \\ = \frac{2x + 2 - 2x + 2}{(x - 1)(x + 1)} \\ = \frac{4}{(x - 1)(x + 1)}$$

$$(2) \quad y = \log x^3 + \log \sqrt{x^2 + 1}$$

$$= 3 \log x + \log(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} \\ = 3 \log x + \frac{1}{2} \log(x^2 + 1)$$

$$y' = 3 \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + 1} (x^2 + 1)' \\ = \frac{3}{x} + \frac{1}{2(x^2 + 1)} \cdot 2x \\ = \frac{3}{x} + \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{3(x^2 + 1) + x \cdot x}{x(x^2 + 1)} \\
 &= \frac{3x^2 + 3 + x^2}{x(x^2 + 1)} \\
 &= \frac{4x^2 + 3}{x(x^2 + 1)}
 \end{aligned}$$

問6

(1) 両辺の自然対数をとると,

$$\begin{aligned}
 \log y &= \log x^x \\
 &= x \log x
 \end{aligned}$$

両辺を $x$ について微分すると,

$$\frac{d}{dy}(\log y) \frac{dy}{dx} = (x)' \log x + x(\log x)'$$

$$\frac{1}{y} \cdot y' = 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x}$$

$$y' = y(\log x + 1)$$

$y = x^x$ だから,

$$y' = x^x(\log x + 1)$$

(2) 両辺の自然対数をとると,

$$\log y = \log x^{\cos x}$$

$$= \cos x \log x$$

両辺を $x$ について微分すると,

$$\frac{d}{dy}(\log y) \frac{dy}{dx} = (\cos x)' \log x + \cos x \cdot (\log x)'$$

$$\frac{1}{y} \cdot y' = -\sin x \log x + \cos x \cdot \frac{1}{x}$$

$$y' = y \left( -\sin x \log x + \frac{\cos x}{x} \right)$$

$y = x^{\cos x}$ だから,

$$y' = x^{\cos x} \left( -\sin x \log x + \frac{\cos x}{x} \right)$$

$$= x^{\cos x - 1} (-x \sin x \log x + \cos x)$$

問7

$f(y) = y^4$ について

$$(\sqrt[4]{x})' = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{4y^3}$$

$y = \sqrt[4]{x}$ だから

$$(\sqrt[4]{x})' = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$$

問8

$$(1) y = \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ とおくと,}$$

$$\sin y = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (0 < y < \frac{\pi}{2}) \text{ であるから}$$

$$y = \frac{\pi}{3} \quad \text{よって, } \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$$

$$(2) y = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ とおくと,}$$

$$\sin y = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (0 < y < \frac{\pi}{2}) \text{ であるから}$$

$$y = \frac{\pi}{4} \quad \text{よって, } \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}$$

問9

$$AB = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

$$\text{よって, } \sin A = \frac{4}{5} \text{ であるから}$$

$$A = \sin^{-1} \frac{4}{5}$$

$$\text{同様に, } \sin B = \frac{3}{5} \text{ であるから}$$

$$B = \sin^{-1} \frac{3}{5}$$

問10

$$(1) y = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ とおくと}$$

$$\cos y = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (0 < y < \frac{\pi}{2}) \text{ であるから}$$

$$y = \frac{\pi}{4} \quad \text{よって, } \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}$$

$$(2) y = \cos^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ とおくと}$$

$$\cos y = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (0 < y < \frac{\pi}{2}) \text{ であるから}$$

$$y = \frac{\pi}{6} \quad \text{よって, } \cos^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6}$$

$$(3) y = \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ とおくと}$$

$$\tan y = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (0 < y < \frac{\pi}{2}) \text{ であるから}$$

$$y = \frac{\pi}{6} \text{ よって, } \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$$

(4)  $y = \tan^{-1} 1$  とおくと

$$\tan y = 1 \quad \left(0 < y < \frac{\pi}{2}\right) \text{ であるから}$$

$$y = \frac{\pi}{4} \text{ よって, } \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}$$

問 11

$$\text{図より, } \cos y = \frac{x}{1} = x \text{ であるから}$$

$$y = \cos^{-1} x \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{また, } \sin y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2} \text{ であるから}$$

$$y = \sin^{-1} \sqrt{1-x^2} \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ より, } \cos^{-1} x = \sin^{-1} \sqrt{1-x^2}$$

問 12

$$(1) y = \sin^{-1} \left(-\frac{1}{2}\right) \text{ とおくと}$$

$$\sin y = -\frac{1}{2} \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}\right) \text{ であるから}$$

$$y = -\frac{\pi}{6} \text{ よって, } \sin^{-1} \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$(2) y = \cos^{-1} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ とおくと}$$

$$\cos y = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad (0 \leq y \leq \pi) \text{ であるから}$$

$$y = \frac{3}{4}\pi \text{ よって, } \cos^{-1} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{3}{4}\pi$$

$$(3) y = \sin^{-1} 0 \text{ とおくと}$$

$$\sin y = 0 \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}\right) \text{ であるから}$$

$$y = 0, \text{ よって, } \sin^{-1} 0 = 0$$

問 13

$$(1) y' = -\frac{1}{\sqrt{1-(2x)^2}} \cdot (2x)'$$

$$= -\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$$

$$(2) y' = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)'$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$\begin{aligned} (3) y' &= \frac{1}{1+(\sqrt{x})^2} \cdot (\sqrt{x})' \\ &= \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} \end{aligned}$$

問 14

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2} \cdot \left(\frac{x}{a}\right)' \\ &= \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{1+\frac{x^2}{a^2}} \cdot \frac{1}{a} \\ &= \frac{1}{a^2 \left(1+\frac{x^2}{a^2}\right)} \\ &= \frac{1}{a^2+x^2} = \frac{1}{x^2+a^2} \end{aligned}$$

問 15

$$f(x) = x^4 - 5x + 2 \text{ とおくと,}$$

$f(x)$  は区間  $[-1, 1]$  で連続である.

また,

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1)^4 - 5 \cdot (-1) + 2 \\ &= 1 + 5 + 2 \\ &= 8 > 0 \end{aligned}$$

$$f(1) = 1^4 - 5 \cdot 1 + 2$$

$$= 1 - 5 + 2$$

$$= -2 < 0$$

よって, 方程式  $f(x) = 0$  は, 区間  $(-1, 1)$  に少なくとも 1 つの実数解をもつ.

問 16

$$f(x) = \sin x - x + 1 \text{ とおくと,}$$

$f(x)$  は区間  $[0, \pi]$  で連続である.

また,

$$\begin{aligned} f(0) &= \sin 0 - 0 + 1 \\ &= 0 - 0 + 1 \\ &= 1 > 0 \end{aligned}$$

$$f(\pi) = \sin \pi - \pi + 1$$

$$= 0 - \pi + 1$$

$$= -\pi + 1 < 0$$

よって、方程式  $f(x) = 0$  すなわち  $\sin x = x - 1$  は、  
区間  $(0, \pi)$  に少なくとも 1 つの実数解をもつ。