

3 章 重積分

§ 1 2 重積分 (p.64~p.77)

問 1

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{2} = 1 \text{ より}, z = -\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}y + 2$$

また、領域Dを

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$$

$$V = \iint_D \left(2 - \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}y \right) dx dy$$

問 2

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \int_0^1 \left\{ \int_1^2 (x^2 - xy) dx \right\} dy \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}yx^2 \right]_1^2 dy \\ &= \int_0^1 \left\{ \left(\frac{8}{3} - 2y \right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}y \right) \right\} dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{7}{3} - \frac{3}{2}y \right) dy \\ &= \left[\frac{7}{3}y - \frac{3}{4}y^2 \right]_0^1 \\ &= \frac{7}{3} - \frac{3}{4} = \frac{28 - 9}{12} = \frac{19}{12} \end{aligned}$$

問 3

$$\begin{aligned} (1) \text{ 与式} &= \int_0^1 \left\{ \int_0^2 (2x + y) dy \right\} dx \\ &= \int_0^1 \left[2xy + \frac{1}{2}y^2 \right]_0^2 dx \\ &= \int_0^1 (4x + 2) dx \\ &= \left[2x^2 + 2x \right]_0^1 \\ &= 2 + 2 = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 与式} &= \int_{-1}^3 \left\{ \int_{-2}^1 xy^2 dy \right\} dx \\ &= \int_{-1}^3 \left[\frac{1}{3}xy^3 \right]_{-2}^1 dx \\ &= \int_{-1}^3 \left(\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}x \right) dx \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} &= \int_{-1}^3 (3x) dx \\ &= \left[\frac{3}{2}x^2 \right]_{-1}^3 \\ &= \left(\frac{27}{2} - \frac{3}{2} \right) \\ &= \frac{24}{2} = 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{ 与式} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x+y) dy \right\} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[-\cos(x+y) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left\{ -\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos x \right\} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left\{ -(-\sin x) + \cos x \right\} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + \cos x) dx \\ &= \left[-\cos x + \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= -\cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} - (-\cos 0 + \sin 0) \\ &= 0 + 1 + 1 - 0 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \text{ 与式} &= \int_0^1 \left\{ \int_0^1 xe^{xy} dy \right\} dx \\ &= \int_0^1 \left[xe^{xy} \cdot \frac{1}{x} \right]_0^1 dx \\ &= \int_0^1 (e^x - e^0) dx \\ &= \int_0^1 (e^x - 1) dx \\ &= \left[e^x - x \right]_0^1 \\ &= e^1 - 1 - (e^0 - 0) \\ &= e - 1 - 1 = e - 2 \end{aligned}$$

問4


(1) 領域を図示すると



よって

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \int_1^2 \left\{ \int_0^x x dy \right\} dx \\ &= \int_1^2 \left[xy \right]_0^x dx \\ &= \int_1^2 x^2 dx \\ &= \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^2 \\ &= \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} \end{aligned}$$


(2) 領域を図示すると



よって

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \int_{\frac{1}{2}}^2 \left\{ \int_0^{\frac{1}{x}} (x - 2y) dy \right\} dx \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^2 \left[xy - y^2 \right]_0^{\frac{1}{x}} dx \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) dx \\ &= \left[x + \frac{1}{x} \right]_{\frac{1}{2}}^2 \\ &= 2 + \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\frac{1}{2}} \right) \\ &= 2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 2 = 0 \end{aligned}$$


(3) 領域を図示すると



よって

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \int_1^2 \left\{ \int_{y^2}^4 y \sqrt{x} dx \right\} dy \\ &= \int_1^2 \left[y \cdot \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_{y^2}^4 dy \\ &= \int_1^2 \left[\frac{2}{3} y x \sqrt{x} \right]_{y^2}^4 dy \\ &= \int_1^2 \left(\frac{2}{3} y \cdot 4\sqrt{4} - \frac{2}{3} y \cdot y^2 \sqrt{y^2} \right) dy \\ &= \frac{2}{3} \int_1^2 (8y - y^4) dy \\ &= \frac{2}{3} \left[4y^2 - \frac{1}{5} y^5 \right]_1^2 \\ &= \frac{2}{3} \left\{ 4 \cdot 2^2 - \frac{1}{5} \cdot 2^5 - \left(4 \cdot 1^2 - \frac{1}{5} \cdot 1^5 \right) \right\} \\ &= \frac{2}{3} \left(16 - \frac{32}{5} - 4 + \frac{1}{5} \right) \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{29}{5} = \frac{58}{15} \end{aligned}$$

(4) 領域を図示すると



よって

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \int_0^1 \left\{ \int_0^{e^y} 2x dx \right\} dy \\ &= \int_0^1 \left[x^2 \right]_0^{e^y} dy \\ &= \int_0^1 \{(e^y)^2 - 0\} dy \\ &= \int_0^1 e^{2y} dy \\ &= \left[\frac{1}{2} e^{2y} \right]_0^1 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2}e^0$$

$$= \frac{1}{2}(e^2 - 1)$$

問5

(1) $x + y \leq 1$ より, $y \leq 1 - x$ であるから, 領域Dは次の不等式で表すことができる.

$$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$$

したがって

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \int_0^1 \left\{ \int_0^{1-x} (x+y) dy \right\} dx \\ &= \int_0^1 \left[xy + \frac{1}{2}y^2 \right]_0^{1-x} dx \\ &= \int_0^1 \left\{ x(1-x) + \frac{1}{2}(1-x)^2 \right\} dx \\ &= \int_0^1 \left\{ x - x^2 + \frac{1}{2} - x + \frac{1}{2}x^2 \right\} dx \\ &= \int_0^1 \left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (-x^2 + 1) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

【別解】

$x + y \leq 1$ より, $x \leq 1 - y$ であるから, 領域Dは次の不等式で表すことができる.

$$0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1 - y$$

したがって

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \int_0^1 \left\{ \int_0^{1-y} (x+y) dx \right\} dy \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{2}x^2 + yx \right]_0^{1-y} dy \\ &= \int_0^1 \left\{ \frac{1}{2}(1-y)^2 + y(1-y) \right\} dy \\ &= \int_0^1 \left\{ \frac{1}{2} - y + \frac{1}{2}y^2 + y - y^2 \right\} dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}y^2 \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - y^2) dy \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \left[y - \frac{1}{3}y^3 \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3}$$

$$(2) x^2 + y^2 \leq 4 \text{ より, } y^2 \leq 4 - x^2,$$

すなわち, $-\sqrt{4 - x^2} \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}$ であるから, 領域Dは次の不等式で表すことができる.

$$-2 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}$$

したがって

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \int_{-2}^2 \left\{ \int_0^{\sqrt{4-x^2}} y dy \right\} dx \\ &= \int_{-2}^2 \left[\frac{1}{2}y^2 \right]_0^{\sqrt{4-x^2}} dx \\ &= \int_{-2}^2 \left\{ \frac{1}{2}(\sqrt{4-x^2})^2 \right\} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^2 (4 - x^2) dx \quad \text{※被積分関数が偶関数} \\ &= \left[4x - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^2 \\ &= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

【別解】

$$x^2 + y^2 \leq 4 \text{ より, } x^2 \leq 4 - y^2,$$

すなわち, $-\sqrt{4 - y^2} \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}$ であるから,

領域Dは次の不等式で表すことができる.

$$0 \leq y \leq 2, -\sqrt{4 - y^2} \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}$$

したがって

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \int_0^2 \left\{ \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} y dx \right\} dy \\ &= \int_0^2 \left[yx \right]_0^{\sqrt{4-y^2}} dy \\ &= \int_0^2 \left\{ y\sqrt{4-y^2} - y(-\sqrt{4-y^2}) \right\} dy \\ &= \int_0^2 2y\sqrt{4-y^2} dy \end{aligned}$$

$$4 - y^2 = t \text{ とおくと, } -2ydy = dt \text{ より, } 2ydy = -dt$$

また, y と t の対応は

y	0	\rightarrow	2
t	4	\rightarrow	0

よって

$$\text{与式} = \int_4^0 \sqrt{t}(-dt)$$

$$= - \int_4^0 \sqrt{t} dt$$

$$= \int_0^4 \sqrt{t} dt$$

$$= \left[\frac{2}{3} t \sqrt{t} \right]_0^4$$

$$= \frac{2}{3} \cdot 4\sqrt{4} = \frac{16}{3}$$

問6

$$(1) x = 2y \text{ より, } y = \frac{x}{2} \text{ であるから,}$$

領域は次の不等式で表すことができる.

$$0 \leq x \leq 2, \quad \frac{x}{2} \leq y \leq 1$$

したがって

$$\text{与式} = \int_0^2 \left\{ \int_{x/2}^1 f(x, y) dy \right\} dx$$

$$(2) y = 2 - \frac{1}{2}x \text{ より, } x = 4 - 2y \text{ であるから,}$$

領域は次の不等式で表すことができる.


$$0 \leq x \leq 4 - 2y, \quad 1 \leq y \leq 2$$

したがって

$$\text{与式} = \int_1^2 \left\{ \int_0^{4-2y} f(x, y) dx \right\} dy$$

問7

$0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1$ であるから, 領域は図のようになる.



この領域は, $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$ と表せるので

$$\text{与式} = \int_0^1 \left\{ \int_0^x e^{-x^2} dy \right\} dx$$

$$= \int_0^1 [e^{-x^2} y]_0^x dx$$

$$= \int_0^1 x e^{-x^2} dx$$

$$-x^2 = t \text{ とおくと, } -2x dx = dt \text{ より, } x dx = -\frac{1}{2} dt$$

また, x と t の対応は

x	0	\rightarrow	1
t	0	\rightarrow	-1

よって

$$\text{与式} = \int_0^{-1} e^t \left(-\frac{1}{2} dt \right)$$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^{-1} e^t dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 e^t dt$$

$$= \frac{1}{2} \left[e^t \right]_{-1}^0$$

$$= \frac{1}{2} (e^0 - e^{-1}) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right)$$

問8

求める体積を V とする. $x + y = 2$ より, $y = 2 - x$ であるから, 領域は次の不等式で表すことができる.

$$0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 2 - x$$

この領域内で $z = 4 - x^2 \geq 0$ なので

$$V = \int_0^2 \left\{ \int_0^{2-x} (4 - x^2) dy \right\} dx$$

$$= \int_0^2 (4 - x^2) \left[y \right]_0^{2-x} dx$$

$$= \int_0^2 (4 - x^2)(2 - x) dx$$

$$= \int_0^2 (x^3 - 2x^2 - 4x + 8) dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 + 8x \right]_0^2$$

$$= 4 - \frac{16}{3} - 8 + 16$$

$$= \frac{12 - 16 + 24}{3} = \frac{20}{3}$$

問9

(1) 領域 D を, $x^2 + y^2 \leq a^2, x \geq 0, y \geq 0$ とすると,

この領域は次の不等式で表すことができる.

$$0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{a^2 - x^2}$$

この領域内で, $z = y \geq 0$ であるから,

求める体積を V とすると

$$\begin{aligned} V &= 2 \iint_D y dxdy \\ &= 2 \int_0^a \left\{ \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} y dy \right\} dx \\ &= 2 \int_0^a \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^{\sqrt{a^2-x^2}} dx \\ &= \int_0^a (\sqrt{a^2-x^2})^2 dx \\ &= \int_0^a (a^2 - x^2) dx \\ &= \left[a^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^a \\ &= a^3 - \frac{1}{3} a^3 = \frac{2}{3} a^3 \end{aligned}$$

(2) 領域 D を, $x^2 + y^2 \leq a^2$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ とすると,

この領域は次の不等式で表すことができる.

$$0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq \sqrt{a^2 - x^2}$$

この領域内で, $z = \sqrt{a^2 - x^2} \geq 0$ であるから,

求める体積を V とすると

$$\begin{aligned} V &= 4 \iint_D \sqrt{a^2 - x^2} dxdy \\ &= 4 \int_0^a \left\{ \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} \sqrt{a^2 - x^2} dy \right\} dx \\ &= 4 \int_0^a \left\{ \sqrt{a^2 - x^2} \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} dy \right\} dx \\ &= 4 \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \left[y \right]_0^{\sqrt{a^2-x^2}} dx \\ &= 4 \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \sqrt{a^2 - x^2} dx \\ &= 4 \int_0^a (a^2 - x^2) dx \\ &= 4 \left[a^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^a \\ &= 4 \left(a^3 - \frac{1}{3} a^3 \right) \\ &= 4 \cdot \frac{2}{3} a^2 = \frac{8}{3} a^3 \end{aligned}$$