


3章 重積分

§2 変数の変換と重積分 (p.97~p.98)

練習問題 2-A

1.

(1) 領域を図示すると




よって、領域Dは、次の不等式で表すことができる。

$$0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$$

したがって

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \iint_D \sqrt{r^2} \cdot r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^\pi \left\{ \int_0^a r^2 \, dr \right\} d\theta \\ &= \int_0^\pi \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_0^a d\theta \\ &= \frac{1}{3} a^3 \int_0^\pi d\theta \\ &= \frac{1}{3} a^3 \left[\theta \right]_0^\pi \\ &= \frac{1}{3} a^3 (\pi - 0) = \frac{1}{3} \pi a^3 \end{aligned}$$

(2) 領域を図示すると



よって、領域Dは、次の不等式で表すことができる。

$$1 \leq r \leq \sqrt{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

したがって


$$\text{与式} = \iint_D \frac{1}{r^2 + 1} \cdot r \, dr \, d\theta$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} \left\{ \int_1^{\sqrt{2}} \frac{r}{r^2 + 1} \, dr \right\} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left\{ \int_1^{\sqrt{2}} \frac{(r^2 + 1)' \cdot \frac{1}{2}}{r^2 + 1} \, dr \right\} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left[\log(r^2 + 1) \right]_1^{\sqrt{2}} d\theta \\ &= \frac{1}{2} (\log 3 - \log 2) \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= \frac{1}{2} (\log 3 - \log 2) \left[\theta \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2} (\log 3 - \log 2)(2\pi - 0) \\ &= \pi(\log 3 - \log 2) \\ &= \pi \log \frac{3}{2} \end{aligned}$$

2.

(1) $0 \leq x + y \leq 2$ より, $-x \leq y \leq -x + 2$ $0 \leq x - y \leq 1$ より, $-x \leq -y \leq -x + 1$ であるから,
 $x - 1 \leq y \leq x$

以上より、領域Dは図のようになる。

(2) $x + y = u \dots \textcircled{1}$, $x - y = v \dots \textcircled{2}$ とする。 $\textcircled{1} + \textcircled{2}$ より, $2x = u + v$ であるから

$$x = \frac{u + v}{2}$$

よって, $\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{1}{2}$, $\frac{\partial x}{\partial v} = \frac{1}{2}$ $\textcircled{1} - \textcircled{2}$ より, $2y = u - v$ であるから

$$y = \frac{u - v}{2}$$

$$\text{よって, } \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial y}{\partial v} = -\frac{1}{2}$$

また, $0 \leq u \leq 2$, $0 \leq v \leq 1$,
ヤコビアンは

$$\begin{aligned}\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} &= \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned}\text{与式} &= \iint_D ue^v \left| -\frac{1}{2} \right| dudv \\ &= \frac{1}{2} \iint_D ue^v dudv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left\{ \int_0^2 ue^v du \right\} dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 e^v \left[\frac{1}{2} u^2 \right]_0^2 dv \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 e^v (4 - 0) dv \\ &= \int_0^1 e^v dv \\ &= \left[e^v \right]_0^1 \\ &= e^1 - e^0 \\ &= \mathbf{e} - \mathbf{1}\end{aligned}$$

3.

(1) 被積分関数は、点(0, 0)で定義されないので、原点を中心とする半径 ε ($0 < \varepsilon < 1$) の円の内部を D から除いた領域を D_ε とする。

$$\text{与式} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \iint_{D_\varepsilon} \frac{xy}{x^2 + y^2} dx dy$$

極座標に変換すると、領域 D_ε は次の不等式で表すことができる。

$$\varepsilon \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

したがって

$$\begin{aligned}\text{与式} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left\{ \int_\varepsilon^1 \frac{r \cos \theta \cdot r \sin \theta}{r^2} \cdot r dr \right\} d\theta \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left\{ \int_\varepsilon^1 r \cos \theta \sin \theta dr \right\} d\theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta \left[\frac{1}{2} r^2 \right]_\varepsilon^1 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\{ (1 - \varepsilon^2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta \right\}\end{aligned}$$

ここで、 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta$ について、 $t = \sin \theta$ とおくと
 $dt = \cos \theta d\theta$

また、 r と t の対応は

$$\begin{array}{c|cc} \theta & 0 & \rightarrow & \frac{\pi}{2} \\ \hline t & 0 & \rightarrow & 1 \end{array}$$

したがって

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta &= \int_0^1 t dt \\ &= \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}\text{与式} &= \frac{1}{2} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (1 - \varepsilon^2) \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} (1 - 0) = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

(2) $x^2 + y^2 \geq 1$ は、円 $x^2 + y^2 = 1$ の外側であるから、

$$\text{与式} = \lim_{a \rightarrow \infty} \iint_D \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} dx dy \text{ とする。}$$

極座標に変換すると、領域 D は次の不等式で表すことができる。

$$1 \leq r \leq a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned}\text{与式} &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \left\{ \int_1^a \frac{1}{(r^2)^2} \cdot r dr \right\} d\theta \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \left\{ \int_1^a r^{-3} dr \right\} d\theta \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{-2} r^{-2} \right]_1^a d\theta \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{a^2} - 1 \right) d\theta \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1}{a^2} - 1 \right) \left[\theta \right]_0^{2\pi} \right\} \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1}{a^2} - 1 \right) \cdot 2\pi \right\} \\ &= -\pi \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a^2} - 1 \right) \\ &= -\pi(0 - 1) = \pi\end{aligned}$$

4.

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

の導出は省略する。※p.89 例題 5

$$(1) \quad x = \frac{t}{\sqrt{2}} \text{ とおくと, } dx = \frac{1}{\sqrt{2}} dt$$

また, x と t の対応は

x	$-\infty$	\rightarrow	∞
t	$-\infty$	\rightarrow	∞

よって

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2 \int_0^{\infty} e^{-t^2} dt \quad e^{-t^2} \text{ が偶関数} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad \text{※p.89 例題 5 より} \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \end{aligned}$$

$$(2) \quad x - 2 = t \text{ とおくと, } dx = dt$$

また, x と t の対応は

x	2	\rightarrow	∞
t	0	\rightarrow	∞

よって

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \int_0^{\infty} e^{-t^2} dt \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad \text{※p.89 例題 5 より} \end{aligned}$$

5.

$$z = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$$

について

$$\frac{\partial z}{\partial x} = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

よって, 求める面積を S とする


$$\begin{aligned} S &= \iint_D \sqrt{(\sqrt{x})^2 + 0^2 + 1} dx dy \\ &= \int_0^3 \left\{ \int_0^{\sqrt{x}} \sqrt{x+1} dy \right\} dx \\ &= \int_0^3 \sqrt{x+1} \left[y \right]_0^{\sqrt{x}} dx \\ &= 3 \int_0^3 (x+1)^{\frac{1}{2}} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 3 \left[\frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^3 \\ &= 2 \left[(x+1)\sqrt{x+1} \right]_0^3 \\ &= 2 \{(3+1)\sqrt{3+1} - (0+1)\sqrt{0+1}\} \\ &= 2 \cdot 7 = \mathbf{14} \end{aligned}$$

6.

図形が表す領域を D , 重心の座標を (\bar{x}, \bar{y}) とする。

領域 D は, y 軸に対して対称だから, $\bar{x} = 0$



領域は, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq y \leq \cos x$

以上より

$$\begin{aligned} \iint_D y \, dxdy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left\{ \int_0^{\cos x} y \, dy \right\} dx \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^{\cos x} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x^2 \, dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

また

$$\begin{aligned} \iint_D dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left\{ \int_0^{\cos x} dy \right\} dx \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[y \right]_0^{\cos x} dx \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx \\ &= 2 \left[\sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

$$= 2 \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right)$$

$$= 2(1 - 0) = 2$$

したがって

$$\bar{y} = \frac{\iint_D y \, dx dy}{\iint_D dx dy} = \frac{\frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{8}$$

したがって、求める重心の座標は、 $(0, \frac{\pi}{8})$

練習問題 2-B

1.

直線 $y = \sqrt{3}x$ と、円 $x^2 + y^2 = 4$ の交点を求める

$$x^2 + (\sqrt{3}x)^2 = 4$$

$$x^2 + 3x^2 = 4$$

$$4x^2 = 4$$


$$x^2 = 1$$

$x \geq 0$ より、 $x = 1$

$$y = \sqrt{3} \cdot 1 = \sqrt{3}$$

よって、交点は $(1, \sqrt{3})$

領域を図示すると



図において、直線 $y = \sqrt{3}x$ と x 軸がなす角 θ は、

$$\tan \theta = \sqrt{3} \text{ より, } \theta = \frac{\pi}{3}$$

よって、極座標に変換すると、領域 D は次の不等式で表すことができる。

$$0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$$

よって

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \iint_D r \cos \theta \cdot r \, dr d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left\{ \int_0^2 r^2 \cos \theta \, dr \right\} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos \theta \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_0^2 d\theta \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos \theta \cdot 8d\theta$$

$$= \frac{8}{3} \left[\sin \theta \right]_0^{\frac{\pi}{3}}$$

$$= \frac{8}{3} \left(\sin \frac{\pi}{3} - \sin 0 \right)$$

$$= \frac{8}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

2.

$x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta$ とおくと

$$\frac{a^2 r^2 \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{b^2 r^2 \sin^2 \theta}{b^2} \leq 1$$

$$r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta \leq 1$$

すなわち、 $r^2 \leq 1$ であるから、 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ また

$$\frac{\partial x}{\partial r} = a \cos \theta, \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = -ar \sin \theta$$

$$\frac{\partial y}{\partial r} = b \sin \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = br \cos \theta$$

であるから、ヤコビアンは

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} &= \begin{vmatrix} a \cos \theta & -ar \sin \theta \\ b \sin \theta & br \cos \theta \end{vmatrix} \\ &= abr \cos^2 \theta + abr \sin^2 \theta \\ &= abr(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = abr (\geq 0) \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \iint_D \{(ar \cos \theta)^2 + (br \sin \theta)^2\} \cdot abr \, dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left\{ \int_0^1 r^2 (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) abr \, dr \right\} d\theta \\ &= ab \int_0^{2\pi} \left\{ (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) \int_0^1 r^3 \, dr \right\} d\theta \\ &= ab \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^1 d\theta \\ &= ab \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{4} ab \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{4} ab \left(\int_0^{2\pi} a^2 \cos^2 \theta \, d\theta + \int_0^{2\pi} b^2 \sin^2 \theta \, d\theta \right) \\ &= \frac{1}{4} ab \left(4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \, d\theta + b^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \, d\theta \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= ab \left\{ a^2 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) + b^2 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) \right\} \\
&= ab \left(\frac{\pi}{4} a^2 + \frac{\pi}{4} b^2 \right) \\
&= \frac{1}{4} \pi ab (a^2 + b^2)
\end{aligned}$$

3.

(1) x と y の符号によって、不等式を場合分けすると

i) $x \geq 0, y \geq 0$ のとき

$$x + y \leq 1 \text{ より}, y \leq -x + 1 \cdots \textcircled{1}$$

ii) $x \geq 0, y \leq 0$ のとき

$$x - y \leq 1 \text{ より}, y \geq x - 1 \cdots \textcircled{2}$$


iii) $x \leq 0, y \geq 0$ のとき

$$-x + y \leq 1 \text{ より}, y \leq x + 1 \cdots \textcircled{3}$$

iv) $x \leq 0, y \leq 0$ のとき

$$-x - y \leq 1 \text{ より}, y \geq -x - 1 \cdots \textcircled{4}$$

①, ②, ③, ④より、領域 D を図示すると



(2) (1) の①より, $x + y \leq 1$

$$\textcircled{4} \text{ より}, -1 \leq x + y$$

$$\text{よって, } -1 \leq x + y \leq 1$$

$$\textcircled{2} \text{ より}, x - y \leq 1$$

$$\textcircled{3} \text{ より}, -1 \leq x - y$$

$$\text{よって, } -1 \leq x + y \leq 1$$

u, v を用いると、領域 D は

$$-1 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 1$$

$$x + y = u \cdots \textcircled{5}, x - y = v \cdots \textcircled{6}$$

⑤+⑥より, $2x = u + v$ であるから

$$x = \frac{u + v}{2}$$

⑤-⑥より, $2y = u - v$ であるから

$$y = \frac{u - v}{2}$$

よって、ヤコビアンは

$$\begin{aligned}
\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} &= \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} \\
&= -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}
\end{aligned}$$


したがって

$$\begin{aligned}
\text{与式} &= \int_{-1}^1 \left\{ \int_{-1}^1 u^2 \cos \frac{\pi v}{2} \cdot \left| -\frac{1}{2} \right| du \right\} dv \\
&= \int_{-1}^1 \left\{ \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^1 u^2 \cos \frac{\pi v}{2} \cdot \left| -\frac{1}{2} \right| du \right\} dv \\
&= \int_{-1}^1 \cos \frac{\pi v}{2} \left[\frac{1}{3} u^3 \right]_0^1 dv \\
&= \frac{1}{3} \int_{-1}^1 \cos \frac{\pi v}{2} dv \\
&= \frac{1}{3} \cdot 2 \int_0^1 \cos \frac{\pi v}{2} dv \\
&= \frac{2}{3} \left[\frac{1}{2} \sin \frac{\pi v}{2} \right]_0^1 \\
&= \frac{4}{3\pi} \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right) \\
&= \frac{4}{3\pi}
\end{aligned}$$

4.

領域 D 内で、 $x = y = 0$ は定義されないので、図のような領域を考え、これを D_ε とする。

また、この領域 D 内で、 $\frac{x}{x^2 + y^2} \geq 0$



$$\text{与式} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{D_\varepsilon} \frac{x}{x^2 + y^2} dx dy$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\varepsilon}^1 \left\{ \int_{x^2}^x \frac{x}{x^2 + y^2} dy \right\} dx \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\varepsilon}^1 x \left[\frac{1}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x} \right]_{x^2}^x dx \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\varepsilon}^1 (\tan^{-1} 1 - \tan^{-1} x) dx \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\varepsilon}^1 \left(\frac{\pi}{4} - \tan^{-1} x \right) dx
\end{aligned}$$

ここで、部分積分法を用いて

$$\begin{aligned}
\int \tan^{-1} x dx &= \int (x)' \tan^{-1} x dx \\
&= x \tan^{-1} x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx \\
&= x \tan^{-1} x - \int \frac{x}{1+x^2} dx \\
&= x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \log(1+x^2)
\end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned}
\text{与式} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\frac{\pi}{4} x - \left\{ x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \log(1+x^2) \right\} \right]_{\varepsilon}^1 \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\{ \left(\frac{\pi}{4} - \tan^{-1} 1 + \frac{1}{2} \log 2 \right) \right. \\
&\quad \left. - \left(\frac{\pi}{4} \varepsilon - \varepsilon \tan^{-1} \varepsilon + \frac{1}{2} \log(1+\varepsilon^2) \right) \right\} \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\{ \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \log 2 \right) \right. \\
&\quad \left. - \left(\frac{\pi}{4} \varepsilon - \varepsilon \tan^{-1} \varepsilon + \frac{1}{2} \log(1+\varepsilon^2) \right) \right\} \\
&= \frac{1}{2} \log 2
\end{aligned}$$

5.

$$(1) \frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma} = t \text{ とおくと, } \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} dx = dt \text{ より, } dx = \sqrt{2}\sigma dt$$

また、 x と t の対応は

x	$-\infty$	\rightarrow	∞
t	$-\infty$	\rightarrow	∞

よって

$$\begin{aligned}
\text{左辺} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} \cdot \sqrt{2}\sigma dt \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \sqrt{2}\sigma \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot 2 \int_0^{\infty} e^{-t^2} dt \\
&= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad \text{※p.89 例題 5}
\end{aligned}$$

= 1 = 右辺

$$(2) \frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma} = t \text{ とおくと, } \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} dx = dt \text{ より, } dx = \sqrt{2}\sigma dt$$

$$x = \sqrt{2}\sigma t + \mu$$

また、 x と t の対応は

x	$-\infty$	\rightarrow	∞
t	$-\infty$	\rightarrow	∞

よって

$$\text{左辺} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} (\sqrt{2}\sigma t + \mu) e^{-t^2} \cdot \sqrt{2}\sigma dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (\sqrt{2}\sigma t + \mu) e^{-t^2} dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{2}\sigma t e^{-t^2} dt + \int_{-\infty}^{\infty} \mu e^{-t^2} dt \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\sqrt{2}\sigma \int_{-\infty}^{\infty} t e^{-t^2} dt + \mu \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt \right)$$

ここで、不定積分 $\int t e^{-t^2} dt$ を求める。

$$-t^2 = u \text{ とおくと, } -2tdt = du \text{ より, } tdt = -\frac{1}{2}du$$

よって

$$\int t e^{-t^2} dt = \int e^u \cdot \left(-\frac{1}{2} du \right)$$

$$= -\frac{1}{2} \int e^u du$$

$$= -\frac{1}{2} e^u = -\frac{1}{2} e^{-t^2}$$

したがって

$$\int_{-\infty}^{\infty} t e^{-t^2} dt = \lim_{\substack{a \rightarrow -\infty \\ b \rightarrow \infty}} \int_a^b t e^{-t^2} dt$$

$$= \lim_{\substack{a \rightarrow -\infty \\ b \rightarrow \infty}} \left[-\frac{1}{2} e^{-t^2} \right]_a^b$$

$$= -\frac{1}{2} \lim_{\substack{a \rightarrow -\infty \\ b \rightarrow \infty}} (e^{-b^2} - e^{-a^2}) = 0$$

以上より

$$\text{左辺} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\sqrt{2}\sigma \int_{-\infty}^{\infty} t e^{-t^2} dt + \mu \cdot 2 \int_0^{\infty} e^{-t^2} dt \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} (\sqrt{2}\sigma \cdot 0 + \mu \cdot \sqrt{\pi})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \mu \sqrt{\pi}$$

$= \mu = \text{右辺}$

6.

$$z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \text{について}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = y$$

ここで

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1 = x^2 + y^2 + 1$$

よって、求める面積を S とすると

$$S = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2 + 1} dx dy$$

領域 D' を、 $x^2 + y^2 \leq 3, x \geq 0, y \geq 0$ とし、極座標に変換すると、領域 D' は次の不等式で表すことができる。

$$0 \leq r \leq \sqrt{3}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

よって

$$S = 4 \iint_{D'} \sqrt{x^2 + y^2 + 1} dx dy$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left\{ \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{r^2 + 1} \cdot r dr \right\} d\theta$$

ここで、 $\int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{r^2 + 1} \cdot r dr$ について、

$$r^2 + 1 = t \text{ とおくと, } 2rdr = dt \text{ より, } rdr = \frac{1}{2}dt$$

また、 r と t の対応は

r	0	\rightarrow	$\sqrt{3}$
t	1	\rightarrow	4

よって

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{r^2 + 1} \cdot r dr &= \int_1^4 \sqrt{t} \cdot \frac{1}{2} dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \right]_1^4 \\ &= \frac{1}{3} [t\sqrt{t}]_1^4 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3} (4\sqrt{4} - 1)$$

$$= \frac{7}{3}$$

したがって

$$S = 4 \iint_{D'} \sqrt{x^2 + y^2 + 1} dx dy$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{7}{3} d\theta$$


$$= 4 \cdot \frac{7}{3} \left[\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{28}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{14}{3} \pi$$

7.

重心の座標を (\bar{x}, \bar{y}) とする。

領域を図示すると



$$y = 2x \text{ より, } x = \frac{y}{2}$$

$$y = 2 - x \text{ より, } x = 2 - y$$

よって、領域 D は次の不等式で表すことができる。

$$\frac{y}{2} \leq x \leq 2 - y, \quad 0 \leq y \leq 1$$

よって

$$\begin{aligned} \iint_D x dx dy &= \int_0^1 \left\{ \int_{\frac{y}{2}}^{2-y} x dx \right\} dy \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{\frac{y}{2}}^{2-y} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left\{ (2-y)^2 - \left(\frac{y}{2} \right)^2 \right\} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(4 - 4y + y^2 - \frac{y^2}{4} \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(4 - 4y + \frac{3}{4} y^2 \right) dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left[4y - 2y^2 + \frac{1}{4}y^3 \right]_0^1 \\
&= \frac{1}{2} \left(4 - 2 + \frac{1}{4} \right) \\
&= 2 - 1 + \frac{1}{8} = \frac{9}{8}
\end{aligned}$$

また

$$\begin{aligned}
\iint_D dxdy &= \int_0^1 \left\{ \int_{\frac{y}{2}}^{2-y} dx \right\} dy \\
&= \int_0^1 \left[x \right]_{\frac{y}{2}}^{2-y} dy \\
&= \int_0^1 \left(2 - y - \frac{y}{2} \right) dy \\
&= \int_0^1 \left(2 - \frac{3}{2}y \right) dy \\
&= \left[2y - \frac{3}{4}y^2 \right]_0^1 \\
&= 2 - \frac{3}{4} = \frac{5}{4}
\end{aligned}$$

したがって

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x dxdy}{\iint_D dxdy} = \frac{\frac{9}{8}}{\frac{5}{4}} = \frac{9}{10}$$

また

$$\begin{aligned}
\iint_D x dxdy &= \int_0^1 \left\{ \int_{\frac{y}{2}}^{2-y} y dx \right\} dy \\
&= \int_0^1 y \left[x \right]_{\frac{y}{2}}^{2-y} dy \\
&= \int_0^1 y \left(2 - y - \frac{y}{2} \right) dy \\
&= \int_0^1 y \left(2 - \frac{3}{2}y \right) dy \\
&= \int_0^1 \left(2y - \frac{3}{2}y^2 \right) dy \\
&= \left[y^2 - \frac{1}{2}y^3 \right]_0^1 \\
&= 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

$$\text{また, } \iint_D dxdy = \int_0^1 \left\{ \int_{\frac{y}{2}}^{2-y} dx \right\} dy = \frac{5}{4}$$

したがって

$$\bar{y} = \frac{\iint_D y dxdy}{\iint_D dxdy} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{4}} = \frac{2}{5}$$

したがって、求める重心の座標は、 $\left(\frac{9}{10}, \frac{2}{5}\right)$