

3章 行列式

問1 ここでは、サラスの方法を用いる。

$$\begin{aligned} (1) \text{ 与式} &= 3 \cdot 1 - (-2) \cdot (-5) \\ &= 3 - 10 \\ &= -7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 与式} &= 1 \cdot 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 \cdot 1 + 4 \cdot 1 \cdot 5 \\ &\quad - 1 \cdot 1 \cdot 5 - 0 \cdot 1 \cdot (-1) - 4 \cdot 2 \cdot 1 \\ &= -2 + 0 + 20 - 5 - 0 - 8 \\ &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{ 与式} &= 1 \cdot 5 \cdot 9 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot 8 \\ &\quad - 1 \cdot 6 \cdot 8 - 2 \cdot 4 \cdot 9 - 3 \cdot 5 \cdot 7 \\ &= 45 + 84 + 96 - 48 - 72 - 105 \\ &= 0 \end{aligned}$$

問2

$$\begin{aligned} (1) (3, 1, 4, 2) &\rightarrow (1, 3, 4, 2) \\ &\rightarrow (1, 2, 4, 3) \\ &\rightarrow (1, 2, 3, 4) \end{aligned}$$

よって、**奇順列**

$$\begin{aligned} (2) (5, 3, 4, 1, 2) &\rightarrow (1, 3, 4, 5, 2) \\ &\rightarrow (1, 2, 4, 5, 3) \\ &\rightarrow (1, 2, 3, 5, 4) \\ &\rightarrow (1, 2, 3, 4, 5) \end{aligned}$$

よって、**偶順列**

問3

(1) 順列(3, 1, 4, 2)に対応する項以外は0である。

$$\begin{aligned} (3, 1, 4, 2) &\rightarrow (1, 3, 4, 2) \\ &\rightarrow (1, 2, 4, 3) \\ &\rightarrow (1, 2, 3, 4) \end{aligned}$$

よって、この順列は奇順列であるから、
行列式の値は、 $-(2 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 3) = -30$

(2) 順列(2, 1, 3, 4)と、(2, 1, 4, 3)に対応する項
以外は0である。

$$\begin{aligned} (2, 1, 3, 4) &\rightarrow (1, 2, 3, 4) \\ \text{よって、この順列は奇順列である。} \\ (2, 1, 4, 3) &\rightarrow (1, 2, 4, 3) \\ &\rightarrow (1, 2, 3, 4) \end{aligned}$$

よって、この順列は偶順列である。

したがって、行列式の値は

$$-(2 \cdot 3 \cdot 9 \cdot 3) + (2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6) = -162 + 144 = -18$$

問4

$$\begin{aligned} (1) \text{ 与式} &= 4 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -7 \end{vmatrix} \\ &= 4\{-1 \cdot (-7) - 1 \cdot 2\} \\ &= 4 \cdot 5 = 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 与式} &= 1 \begin{vmatrix} -3 & -5 & 5 \\ 0 & -5 & 2 \\ 0 & -6 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (-3) \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ -6 & 3 \end{vmatrix} \\ &= -3\{-5 \cdot 3 - 2 \cdot (-6)\} \\ &= -3 \cdot (-3) = 9 \end{aligned}$$

問5

$$\begin{aligned} (1) \text{ 左辺} &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= a_{11} a_{22} \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} & \cdots & a_{3n} \\ 0 & a_{44} & \cdots & a_{4n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \cdots \\ &= a_{11} a_{22} \cdots a_{nn} = \text{右辺} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) |E_n| &= \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}}_{n\text{次}} \\ &= 1 \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}}_{(n-1)\text{次}} \\ &= 1 \cdot 1 \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}}_{(n-2)\text{次}} \\ &= \cdots \\ &= 1^n = 1 \end{aligned}$$

問6

(1) n 次の正方行列において、第 k 行のすべての成分が0であるとする、第 k 行から0をくり出して

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0 \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

$$(2) \text{ 左辺} = \begin{vmatrix} ca_{11} & ca_{12} & \cdots & ca_{1n} \\ ca_{21} & ca_{22} & \cdots & ca_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ca_{n1} & ca_{n2} & \cdots & ca_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= c \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ ca_{21} & ca_{22} & \cdots & ca_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ca_{n1} & ca_{n2} & \cdots & ca_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= c^2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ca_{n1} & ca_{n2} & \cdots & ca_{nn} \end{vmatrix}$$

= ...

$$= c^n \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= c^n |A| = \text{右辺}$$

問7

$$(1) \text{ 与式} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -7 & -4 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} -7 & -4 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= -7 \cdot (-1) - \{(-4) \cdot (-1)\}$$

$$= 7 - 4 = 3$$

$$(2) \text{ 与式} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 5 & -12 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= -1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -12 \\ 0 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= -\{5 \cdot 5 - (-12) \cdot 0\} = -25$$

問8

$$(1) \text{ 与式} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & a-x & a-x \\ x & y-x & b-x \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} a-x & a-x \\ y-x & b-x \end{vmatrix}$$

$$= (a-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ y-x & b-x \end{vmatrix}$$

$$= (a-x)\{(b-x) - (y-x)\}$$

$$= (a-x)(b-y)$$

$$(2) \text{ 与式} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ (b-a)(b+a) & (c-a)(c+a) \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b+a & c+a \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a)\{(c+a) - (b+a)\}$$

$$= (b-a)(c-a)(c-b)$$

$$= (a-b)(b-c)(c-a)$$

問9

${}^tAA = E$ の両辺の行列式を求めると

$$|{}^tAA| = |E| = 1$$

すなわち、 $|{}^tAA| = 1$

ここで、 $|{}^tA| = |A|$ であるから

$$|A|^2 = 1 \text{となるので、} |A| = \pm 1$$